

Noaks Ark

Noaks Ark พยายามที่จะลดการแพร่เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เราให้การสนับสนุนแก่บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ใกล้ชิด นอกจากนี้เรายังให้การศึกษ ข้อมูล และคำปรึกษา ให้การตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็ว ให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมทางสังคม กรุณาติดต่อเรา!

สนับสนุนงานของเราโดยการสมัครสมาชิก

www.noaksark.org/medlem

Thai



Noaks Ark ตั้งอยู่ที่

Luleå โทร: 0920-23 06 50

Umeå โทร: 076-776 18 88

Sundsvall โทร: 070-239 39 65, 076-298 01 60

Gävle โทร: 026-18 33 01

Stockholm* โทร: 08-700 46 00

Norrköping* โทร: 011-443 37 00

Växjö* โทร: 0470-193 81

Göteborg โทร: 031-361 46 00

Malmö* โทร: 040-611 52 15

ดูข้อมูลของเราบนอินเทอร์เน็ตได้ที่
www.noaksark.org/vi-finns-har

* นอกจากนี้ยังมีคลินิกตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็ว (ผลภายใน 15 นาที)

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณติดเชื้อเอชไอวี

มีทางออกทางเดียวคือการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ คุณสามารถรับการทดสอบได้ที่ Noaks Ark แผนกคลินิกการตรวจเชื้อโรค "Sesam clinics" คลินิกเด็ก คลินิกผิวหนัง คลินิกสุขภาพ ศูนย์สุขภาพทางเพศ จากสูตินารีแพทย์ผดุงครรภ์

การตรวจหาเอชไอวีที่ Noaks Ark

มีหลายหน่วยงานที่ตรวจหาเอชไอวีแบบรวดเร็ว (ผลภายใน 15 นาที) www.noaksark.org/hivtest

หาคลินิกตรวจหาเอชไอวี

คลินิกทั้งหมดในสวีเดน: www.hivtest.nu

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีหรือไม่



โทรหา Noaks Ark Direkt ที่ 020-78 44 40
www.noaksark.org

เอชไอวีคืออะไร

เอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งตอบสนองต่อการรักษา ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถรักษาเชื้อเอชไอวีได้ แต่ก็มียาและการรักษาในประเทศสวีเดนมีประสิทธิผลมากซึ่งช่วยยืดอายุของผู้ป่วยที่มีเชื้อเอชไอวีได้ อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้รับการรักษาเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต นี่จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อเริ่มการรักษาโดยเร็วที่สุด

เยี่ยมชมเพจข้อมูลของเราบนอินเทอร์เน็ต:

www.noaksark.org/omhiv

สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร

มีความเสี่ยงสูงสุดที่บุคคลจะส่งต่อเชื้อเอชไอวีสู่บุคคลอื่น ระหว่างสองสามเดือนแรกหลังได้รับเชื้อก่อนเริ่มการรักษา ซึ่งดำเนินการเมื่อพบว่ามีปริมาณเชื้อไวรัสจำนวนมาก แต่บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีจะยังไม่ทราบ

เชื้อเอชไอวีสามารถส่งต่อผ่านทางทวารหนัก ช่องคลอด และการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก หรือโดยการใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ไวรัสยังสามารถส่งต่อไปยังเด็กได้ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการให้นมบุตร

เอชไอวีไม่สามารถส่งผ่านทาง การติดต่อทางสังคมได้

การติดเชื้อที่กำลังรักษา

การรักษาเชื้อเอชไอวีในวันนี้มีประสิทธิผลมากซึ่งสามารถลดจำนวนของไวรัสให้อยู่ในระดับน้อยมากที่สามารถวัดได้ ขณะนี้ความเสี่ยงของการส่งต่อเชื้อไวรัสผ่านการมีเพศสัมพันธ์แทบจะน้อยมาก

ความเสี่ยงของการส่งต่อเชื้อเอชไอวีจากมารดาไปสู่บุตรระหว่างการตั้งครรภ์ หรือการคลอดบุตร มีน้อยมากหากเริ่มการรักษาในเวลาที่เหมาะสม ระดับความเสี่ยงของการส่งต่อเชื้อเอชไอวีเมื่อใช้เข็มฉีดยาร่วมกันน้อยลงในปัจจุบัน แต่ถือว่าการรักษาเชื้อเอชไอวีลดความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างมาก

ป้องกันตนเองและผู้อื่น

บุคคลสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้โดยขาดความรู้ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นแนวทางที่ดีในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่าใช้หลอดฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

ตรวจเชื้อของตนเองหากไม่แน่ใจและอย่ากลัวที่จะถามคู่ของท่านว่าเคยตรวจเชื้อหรือไม่

ความเสี่ยงในการส่งต่อหรือรับเชื้อเอชไอวีอาจเพิ่มขึ้นหากติดเชื้ออื่นที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว